



CHRISTEYNS

AGRI

**BENVENUTI NEL
NOSTRO MONDO
VERDE BLU**

FONDAZIONE & PROPRIETÀ

1946



JR Christeyns fonda la
"soap factory
Christeyns" a Ghent
(Belgio)

1976



Albin De Vos
acquisisce l'azienda

1989



**La famiglia
Bostoen** assume
la gestione di
Christeyns



CHRISTEYNS

IL TUO PARTNER NEI PRODOTTI PER L'IGIENE



**CURA
PROFESSIONALE
DEI TESSUTI**



**INDUSTRIA
ALIMENTARE
&
ZOOTECNIA**



**PULIZIA
PROFESSIONALE**



MEDICAL CARE




**LIFE
SCIENCES**



GRUPPO CHRISTEYNS

FATTURATO 1993 - 2024



fatturato 2024

€ 445 M

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE

I NOSTRI CLIENTI



INDUSTRIA DELLA
CARNE



INDUSTRIA DEL PESCE



INDUSTRIA LATTIERO
CASEARIA



INDUSTRIA DELLE BEVANDE



BIRRIFICI ED ENOLOGIA



PANIFICI E INDUSTRIA
DOLCIARIA



ALIMENTI TRATTATI



FOOD RETAIL

LA DIVISIONE FOOD&AGRI

LUNGO TUTTA LA FILIERA ALIMENTARE, DALL'ALLEVAMENTO AL PRODOTTO FINITO PER IL CONSUMO




IL GRUPPO CHRISTEYNS NEL MONDO

**Attività proprie e
stabilimenti produttivi**

Attività proprie

Distributori

24 siti produttivi nel mondo





DALLA SALA PARTO ALLA VITELLAIA

**la prevenzione igienica:
Il low cost che premia
di
Gloria Brambati e Luca Chiara**

Pronti... partenza... via... ma non è così!



Il “Buongiorno Mondo” del vitello che esce dal ventre materno, è fin da subito, una corsa in salita.

Nasce immunodepresso, senza anticorpi. Proprio per questo i microorganismi patogeni presenti nell’ambiente, comportano per esso un rischio sanitario, compromettendo talvolta, la sua carriera produttiva.

Un elevato standard igienico della sala parto, ci aiuterà nella prevenzione delle infezioni neonatali.

Piani di sanificazione: sala parto

PROCEDURA STANDARD

detersione

Sequenza dei trattamenti	Prodotto
FASE DI SGROSSATURA Rimuovere fisicamente tutto il materiale solido dalle superfici Effettuare un accurato risciacquo fino alla completa rimozione dello sporco visibile	Con attrezzature manuali, raspe e pale ACQUA
FASE DI SCHIUMATURA Schiumare in modo uniforme le superfici Nei trattamenti delle superfici verticali è consigliabile applicare la schiuma muovendo la lancia dal basso verso l'alto Lasciare agire la schiuma per 30 minuti	SCHIUMACTIV Schiumogeno alcalino con attività solvente Dosaggio 5% a Temperatura ambiente
FASE DI RISCIAQUO INTERMEDIO Rimuovere accuratamente mediante risciacquo ad alta pressione tutti i residui di sporco e di detergente	ACQUA Temperatura ambiente

Piani di sanificazione: sala parto

PROCEDURA STANDARD

disinfezione

FASE DI DISINFEZIONE TERMINALE


Applicare a spruzzo ed in modo uniforme la soluzione disinfettante su tutte le superfici che sono state precedentemente lavate e risciacquate e lasciate asciugare.

Lasciare agire il disinfettante rispettando i tempi di contatto prescritti: **5 minuti per attività microbica e 30 minuti per attività virucida**

MIDA SAN 333 HN PMC 21309

Disinfettante residuale Attività: battericida, fungicida, sporicida, virucida

Dosaggio 1,5% a T° ambiente



Far asciugare prima di accasare gli animali

Piani di sanificazione

PIANO B: CONTROLLARE LA CARICA MICROBICA AMBIENTALE

Succede spesso, che la sala parto, è un ambiente ricavato in qualche parte della stalla, senza pendenze e canalette di scolo.

Diventa così difficoltoso lavare e occorre quindi trovare dei compromessi, per evitare che la carica microbica ambientale, diventi insostenibile.


La pulizia " a secco" e un disinfettante formulato per essere attivo anche in presenza di sostanza organica, ci aiuteranno a mantenere condizioni ambientali accettabili.

Sarà molto importante stabilire la frequenza di questi interventi.





MIDA SAN 840 BED SAN




microgranuli adsorbenti e a lento rilascio d'ossigeno.



LA PREVENZIONE IGIENICA NELLA VITELLAIA

Piani di sanificazione: attrezzature destinate ai vitelli **secchi alimentatori, biberon, tettarelle, sonde per colostro**



Piani di sanificazione: la vitellaia

superfici di stabulazione

1

**sgrossatura
fisica**

2

**Schiumatura:
SCHIUMACTIV
5%**


3

risciacquo

4



**Disinfezione:
CHRIOX 5
PMC 20163
2%**

**MIDA SAN 333 HN
PMC 21309
1,5%**



Far asciugare prima di accasare gli animali

Reset delle superfici: La doppia disinfezione



Far asciugare prima di accasare gli animali

Efficacia disinfettante di CHRIOX 5 PMC 20163

L'efficacia disinfettante del prodotto **CHRIOX 5 PMC 20163** è accertata tramite test EN descritti in tabella:

STANDARD EN	METODO DI APPLICAZIONE	ATTIVITA'	ORGANISMI TARGET
13697	1% per 5 min a 20°C	Battericida	Escherichia Coli Salmonella typhimurium Campylobacter jejuni
13697	1% per 15 minuti a 20°C	Fungicida	<i>Candida albicans</i>
13697	1% per 15 minuti a 20°C	Fungicida	<i>Aspergillus brasiliensis</i>
13704	0,8% per 60 minuti a 20°C 4,8% per 10 minuti a 20°C	Sporicida	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus cereus</i>
14476	0,1% per 60 minuti a 20°C 0,8% per 5 minuti a 20°C	Virucida	Adenovirus type 5
14476	0,8% per 60 minuti a 20°C 4,0% per 15 minuti a 20°C	Virucida	Poliovirus type 1
14675	0,5% per 10 minuti a 10°C	Virucida	African Swine Fever Virus Porcine Respiratory Reproductive Syndrome virus Swine Vesicular Disease Swine Enterovirus type 1

Efficacia disinfettante di SAN 333 HN PMC 21309

L'efficacia disinfettante del prodotto **MIDA SAN 333 HN** è accertata tramite test EN descritti in tabella:

Test in sospensione

STANDARD EN	METODO DI APPLICAZIONE	ATTIVITA'	ORGANISMI TARGET
1656	0,1% per 15 min a 20°C 2% per 1 min a 10°C	Battericida	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Proteus hauseri</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>
1657	3% per 30 min a 30°C 4% per 5 min a 10°C	Fungicida	<i>Aspergillus brasiliensis</i>
1657	0,2% per 15 min a 20°C 2% per 1 min a 10°C 0,4% per 5 min a 10°C	Levuricida	<i>Candida albicans</i>
14675	1% per 1 min a 10°C 0,5% per 5 min a 10°C	Virucida	Bovine Enterovirus Type 1
14675	0,5% per 30 min a 10°C	Virucida	African Swine Fever Virus Avian Influenza Virus (H1N1) Newcastle Disease Virus (NDV)
14476	1% per 15 min a 20°C	Virucida	Poliovirys Type 1 Adenovirus Type 5 Murine Norovirus

Test di superficie

STANDARD EN	METODO DI APPLICAZIONE	ATTIVITA'	ORGANISMI TARGET
14349	0,5% per 1 min a 10°C	Battericida	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Proteus vulgaris</i> <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>Enterica</i> sierotipo <i>enteritidis</i>
16438	6% per 5 min a 10°C 2% per 30 min a 10°C	Fungicida	<i>Aspergillus brasiliensis</i>
16438	0,5% per 5 min a 10°C 1% per 1 a 10°C	Levuricida	<i>Candida albicans</i>
16777	1% per 15 min a 20°C	Virucida	Adenovirus Type 5 Murine Norovirus
17122	0,5% per 5 min a 10°C	Virucida	Porcine Parvovirus



SPECIALISTI NELL'IGIENE E NEL BENESSERE ANIMALE

Il vostro consulente
Gloria Brambati
brambatigloria@gmail.com
3356852830

**NON È NECESSARIO FARE IL GIRO DEL MONDO
PER OTTENERE UNA BIOSICUREZZA COMPLETA**

FEEL OUR PASSION